

# Salcedol®

## HIDROXIDO DE ALUMINIO HIDROXIDO DE MAGNESIO SIMETICONA ANTIACIDO - ANTIFLATULENTO SUSPENSION - V.A.: ORAL

### FORMULA

Cada 10 mL contiene:

Hidróxido de Aluminio.....	400 mg
Hidróxido de Magnesio.....	300 mg
Simeticona.....	50 mg
Excipientes c.s.p.....	10 mL

### ACCION TERAPEUTICA

Antiácido, antiflatulento.

### PROPIEDADES

La presencia de la simeticona, desarrolla un efecto espumolítico-antiflatulento; disminuyendo la tensión superficial entre las burbujas de aire y moco localizadas en el tracto gastrointestinal, haciendo así posible la liberación de gas, aliviando los síntomas de distensión intestinal.

La presencia del hidróxido de aluminio permite la relajación del músculo gástrico, mientras el hidróxido de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico neutralizándolo; aliviando los síntomas de hiperacidez estomacal.

### INDICACIONES

En el tratamiento de la hiperacidez gástrica, gastritis, duodenitis, hernia hiatal, meteorismo, flatulencia; como coadyuvante en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal, laxante hiperosmótico salino y lubricante.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.  
Insuficiencia renal severa. El hidróxido de aluminio puede causar deficiencia de fósforo en pacientes con dietas pobres en fósforo.

### REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Puede causar constipación, principalmente en ancianos.  
Náuseas, vómitos, calambres musculares.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Los preparados con hidróxido de aluminio demoran el vacío gástrico lo que disminuye la absorción intestinal de varios fármacos.

Por combinación de factores, los antiácidos disminuyen la biodisponibilidad de hierro, tetraciclinas, benzodiazepinas, ranitidina, vitamina A, fluoruros y fosfatos. No deberá administrarse ninguna medicación 2 horas antes y 2 horas después de la ingestión del antiácido.

### MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

El Hidróxido de Aluminio, puede relajar el músculo liso gástrico y demorar el vaciado, también puede estimular la secreción del moco, lo que aumentaría la barrera mucosa para el ácido. Se elimina por la orina.

El Hidróxido de Magnesio, es un antiácido no absorbible que reacciona químicamente con el ácido clorhídrico del estómago neutralizándolo. De esta manera aumenta el pH del contenido gástrico, aliviando los síntomas de la hiperacidez.

Al reducir el contenido ácido en la luz del esófago produce un aumento del pH intraesofágico y una disminución de la actividad de la pepsina, lo que contribuye al control del reflujo gastroesofágico. Su absorción no es buena, ya que solo un 10% de la dosis administrado se absorbe en el intestino. Su eliminación es fecal y renal.

La Simeticona, actúa como un tensoactivo disminuyendo la tensión superficial de las islas espumantes o burbujas del moco y aire localizadas en el tracto gastrointestinal. A raíz de ello se produce la liberación del gas por vía oral (eructos) o rectal (flatos) aliviando la distensión y el meteorismo a nivel intestinal.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No suministrar en pacientes que reciben tetraciclinas y en niños menores de 6 años, debido a los riesgos del hipermagnesiano.

### POSOLOGIA Y MODO DE USO

5 a 10 mL después de las comidas y antes de acostarse.  
Estas dosis puede modificarse de acuerdo al criterio del médico.

### RESTRICCIONES DE USO

Existen reportes de hipermagnesia e hiperreflexia tendinosa en neonatos de madres que consumieron antiácidos en grandes cantidades durante el embarazo.

Debido a eso es categoría B de uso durante el embarazo.

### SOBREDOSIS

Estas drogas antiácidas no producen en general fenómenos sistémicos, salvo en el caso de personas con insuficiencia renal.

**En caso de sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.**

### PRESENTACION

Caja conteniendo suspensión x 100 mL

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 07429-02-EF

Conservar a temperatura inferior a 30°C.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
**Regente:** Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya

Guayaki®



división **Salud Humana**

Elaborado por **GUAYAKI S.A.**  
División Salud Humana



Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895  
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416  
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay