

Sarcolisín®

BENZOATO DE BENCILO - BENZOCAINA ESCABICIDA EMULSION - V.A.: TOPICA DERMICA

FORMULA

Cada 100 mL contiene:

Benzoato de Bencilo.....	15 mL
Benzoacina.....	2 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

ACCION TERAPEUTICA

Escabicida.

PROPIEDADES

Sarcolisín es una emulsión que por su potente acción escabicida (extermina el *Sarcoptes Scabiei*, productor de la sarna), es el medicamento de elección para el tratamiento de la sarna humana.

Su uso asegura un rápido exterminio del parásito y desaparición del prurito, surcos epidérmicos y otras molestias ocasionadas por la sarna.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento de escabiosis (sarna) y como ovidica sobre las larvas de la pediculosis.

CONTRAINDICACIONES

No debe aplicarse cuando se presente irritación o inflamación de la piel después de su uso en emulsión.

No administrar en presencia de quemaduras de la piel, ni en personas con antecedentes de crisis convulsivas, durante el embarazo y la lactancia.

El benzoato de bencilo no debe usarse en la cara, ojos, membranas mucosas y meato urinario. Tampoco se recomienda su uso en lactantes y niños menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Puede presentarse irritación en los ojos, piel y mucosas. Algunas veces puede producir reacciones cutáneas eritematosas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El benzoato de bencilo es un escabicida con bajo índice de toxicidad, la irritación cutánea local, prurito y reacciones de hipersensibilidad pueden ser reportadas con este agente, la aplicación apropiada del benzoato de bencilo en las concentraciones indicadas para los pacientes puede disminuir potencialmente estos efectos. No usar inmediatamente después de la aplicación de Sarcolisín, cremas humectantes o sustancias oleosas en la piel.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

El benzoato de bencilo, escabicida que corresponde químicamente a un éster de ácido benzoico, produce la muerte no solo de los ácaros adultos, sino también de huevos y larvas; a su vez es ovidica sobre las liendres de la pediculosis. Desarrolla una acción irritante local, antipruriginosa especialmente en pacientes alérgicos.

Su fuente de absorción es percutáneamente que es el estrato córneo de la epidermis. Esta capa densa de células muertas, queratinizada, se opone a la disfunción de las sustancias, tanto hidrosolubles como liposolubles, se transforma en el organismo en ácido hipúrico y su excreción es por la orina.

La Benzoacina cuya acción es inhibir la fase de despolarización de la membrana neuronal, lo que da lugar a un potencial de propagación insuficiente y el consecuente bloqueo de la conducción. Es bien absorbido a través de las mucosas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Durante el embarazo se utiliza con precaución especialmente durante los primeros tres meses de gestación, no se conoce aún si la sustancia pasa a la leche materna, en todo caso no aplicar en el área de los pechos. Aunque queda la prescripción de este medicamento a juicio del médico.

SOBREDOSIS

El benzoato de bencilo es convertido en ácido hipúrico sistemáticamente las características son los síntomas tóxicos que no pueden ser descriptos.

El benzoato de bencilo es irritante lo cual puede causar sensación de picazón en la aplicación de la piel; estimulación del sistema nervioso y convulsiones esto puede sucederse seguida de la ingestión.

La ingestión de 1 g/kg de benzoato de bencilo causa incoordinación, excitación y convulsiones. El tratamiento consiste en removerlo por medio de un lavado gástrico seguido por medidas de sostén. **En caso de sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.**

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Sarcolisín está especialmente indicado en:

Niños mayores de 2 a 12 años.

Se debe aplicar con algodón en todo el cuerpo, previo baño de limpieza con agua caliente y jabón. Una vez secada la emulsión, puede aplicarse de nuevo en las zonas más afectadas y a las 24 horas, se realiza un baño de limpieza y cambio de ropas, el tratamiento puede repetirse durante 3 días.

Es indispensable hervir las ropas del paciente y de la cama, así como tratar todas las personas afectadas en contacto con el enfermo, bajo penas de seguras reinfecciones, los resultados son excelentes, con el 100% de curaciones.

AGITAR ANTES DE USAR.

PRESENTACION

Caja conteniendo frasco x 50 mL.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 06350-04-EF

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. N° 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya


Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administr.: Av. Brasilía N° 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay