

Mico Aportil®

Nitrato de Miconazol 2 g ANTIMICOTICO DE AMPLIO ESPECTRO CREMA DERMICA - V.A.: TOPICA DERMICA

FORMULA

Cada 100 g contiene:
Nitrato de Miconazol.....2 g
Excipientes c.s.p.....100 g

ACCION TERAPEUTICA

Antimicótico.

PROPIEDADES

MICO APORTIL (nitrato de miconazol) es un derivado sintético del 1-fenilimidazol. Antifúngico de amplio espectro que actúa en la dermatomycosis: Dermatofitos, hongos, parásitos de la piel, cabellos y uñas; levaduras u hongos, huéspedes de piel y mucosas (moniliasis). Dado que MICO APORTIL crema, tiene un efecto bactericida sobre ciertas bacterias gram positivas, puede usarse en micosis secundarias infectadas por tales organismos.

INDICACIONES

MICO APORTIL está indicado para aplicación tópica en el tratamiento de hongos y/o infecciones de la piel: tiña pedis (pie de atleta), tiña cruris y tiña coporis causada por trichophyton rubrum, trichophyton mentagrophytes y epidermophyton floccosum, en el tratamiento de candidiasis cutánea (moniliasis) y en el tratamiento de tiña versicolor e infecciones por bacterias gram positivas.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la droga.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Rara vez puede causar irritación o sensación de ardor y prurito. El tratamiento local con MICO APORTIL, se tolera perfectamente. No deja manchas en la piel ni en las ropas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No es relevante debido a que Mico Aportil crema, aplicado tópicamente no se absorbe.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

El mecanismo de acción antimicótico del miconazol consiste en la inhibición de diversos sistemas enzimáticos oxidativos para la síntesis de los esteroides necesarios en el mantenimiento de la pared de los hongos, como lo es el ergosterol; además esta inhibición se manifiesta para la biosíntesis de los fosfolípidos y triglicéridos, resultado en la lisis del hongo.

Se absorbe y distribuye hasta el estrato córneo de la piel, donde permanece hasta por período mayores de cuatro días, en forma sistémica su absorción es inferior al 1% de la dosis administrada, si se administra a nivel de mucosas (vaginal) puede alcanzar el 1,5%. Su eliminación es menor al 1% de la dosis aplicada, se encuentra sin modificación en los tejidos, esto corresponde a los bajos niveles de absorción en aplicación tópica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de reacción de sensibilidad o irritación, se deberá discontinuar el tratamiento. No debe ponerse en contacto con la mucosa ocular.

POSOLOGIAS Y MODO DE USO

Micosis de la piel:

Aplicar 2 veces al día, sobre la zona afectada, friccionando suavemente para facilitar la penetración. Cuando las lesiones hayan desaparecido, es conveniente continuar el tratamiento por unos 10 días para prevenir recaídas.

Infecciones de las uñas:

Córtar las uñas lo máximo posible.

Aplicar la crema una vez al día en la uña afectada. Cubrir con un vendaje oclusivo no perforado.

Luego del desprendimiento de la uña infectada continuar sin interrumpir el tratamiento hasta el crecimiento de la nueva uña y obtener una cura definitiva.

PRESENTACION

Caja conteniendo como x 15 g.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 07541-03-EF

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya

Guayaki®



división **Salud Humana**

Elaborado por **GUAYAKI S.A.**
División Salud Humana



Ofic. Administr.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay