

Enterogel®

**CLORURO DE SODIO - CLORURO DE POTASIO
CLORURO DE MAGNESIO - HIDROXIDO DE
ALUMINIO - PECTINA CITRICA
ANTI-DIARREICO NO ANTIBIOTICO
RESTAURADOR ELECTROLITICO
SUSPENSION - V.A.: ORAL**

FORMULA

Cada 5 mL contiene:

Pectina Citrica.....	50 mg
Hidrox. de Aluminio.....	1,5 mL
Cloruro de Sodio.....	50 mg
Cloruro de Potasio.....	25 mg
Cloruro de Magnesio.....	0,75 mg
Fosfato Tricálcico.....	5 mg
Carbonato de Calcio.....	7,5 mg
Excipientes c.s.p.....	5 mL

ACCION TERAPEUTICA

Antidiarreico no antibiótico, restaurador electrolítico.

PROPIEDADES

ENTEROGEL, controla eficazmente, el cuadro diarreico y restaura el equilibrio electrolítico. No altera la flora bacteriana, ni provoca atonía de la musculatura intestinal.

INDICACIONES

Cuadros diarreicos de cualquier etiología, que se acompañan de riesgos de deflexión electrolítica.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

El uso prolongado puede producir constipación, este efecto es mayor en ancianos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Disminuyen la absorción y biodisponibilidad de ciertos fármacos, como hierro, fenotiazinas, digoxinas, por lo que es conveniente evitar el uso simultáneo.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

ENTEROGEL es un antidiarreico no antibiótico que ejerce una acción protectora de la mucosa intestinal, con poder antiácido y restaurador electrolítico.

El Hidróxido de Aluminio, en el medio intestinal, neutralizan el ácido del contenido gástrico, aumentan la presión del esfínter esofágico inferior y el clearance esofágico, el hidróxido de aluminio puede relajar el músculo liso gástrico y demorar el vaciado.

El Cloruro de Potasio y Sodio, una enzima ligada a la membrana adenosintrifosfatasa sodio-potasio dependiente, transporta en forma activa sodio al exterior y potasio al interior de las células para mantener los gradientes de concentración. Se elimina por vía renal 90% de la dosis.

La Pectina Cítrica forma una capa protectora que tapiza las mucosas.

Es un polvo químicamente inerte y no neutraliza el ácido clorhídrico, sino que su mismo acción protectora, al disminuir la irritación de la mucosa, puede disminuir algo la secreción ácida en el intestino, en caso de diarrea, al recubrir la mucosa inflamada, la pectina absorbe y fija los toxinas bacterianas y productos tóxicos por lo que disminuye la absorción o irritación de las mismas, no se absorben y se elimina por las heces.

Magnesio: este catión (presente en la fórmula en forma de cloruro de magnesio) es uno de los principales del líquido intracelular junto con el potasio. Gran parte del contenido del magnesio del organismo se encuentran combinados en el hueso con el calcio y el fósforo formando sales complejas. Este catión tiene importante participación en los procesos enzimáticos en los cuales interactúa como activador al igual que el calcio.

La presencia del fosfato tricálcico y el carbonato de calcio evitan la depleción del ión calcio en cuadros de diarrea con deshidratación evitando la aparición de la irritabilidad neuromuscular y posterior cuadro de tetania. Se absorbe bien por vía oral y se eliminan por vía renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El hidróxido de magnesio y otras sales de magnesio pueden causar depresión del sistema nervioso central, en presencia de insuficiencia renal.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Salvo prescripción médica:

Niños hasta 3 años: 2,5 a 5 mL cada 4 horas

Niños de 3 a 10 años: 5 a 10 mL cada 4 a 6 hs.

Adultos: 15 a 20 mL cada 4 a 6 horas.

AGITAR ANTES DE USAR.

RESTRICCIONES DE USO

No tiene restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia.

SOBREDOSIS

En caso de intoxicación o sobredosis, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo frasco x 120 mL

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N°: 06008-04-EF

Mantener a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Doriela Díaz Girett - Reg. N° 5459

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administ.: Av. Brasilia N° 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay