

Novamox® Duo 875 Amoxicilina 875 mg Novamox® Duo 1000 Amoxicilina 1000 mg

ANTIBIOTICO - BACTERICIDA
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
POLVO PARA PREPARAR UNA
SUSPENSION EXTEMPORANEA
V.A.: ORAL

FORMULAS

NOVAMOX DUO 875

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina.....875 mg
(Equivalente a 1004,36 mg de Amoxicilina Trihidrato)
Excipientes c.s.p.....1 comprimido recubierto

NOVAMOX DUO 1000

SUSPENSION EXTEMPORANEA

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene:

Amoxicilina.....1000 mg
(Equivalente a 1147,842 mg de Amoxicilina Trihidrato)
Excipientes c.s.p.....5 mL

ACCION TERAPEUTICA

NOVAMOX DUO 875 y 1000 son antibióticos de acción bactericida, contra una gran variedad de gérmenes gram(+) y gram (-).

PROPIEDADES

Antibiótico betalactámico. Penicilina semisintética del grupo de la aminopenicilinas. Tiene buena absorción vía oral no influida por alimentos.

INDICACIONES

Aparato Respiratorio: traqueítis, bronquitis, neumonías, bronconeumonías, pleuresia, bronquiectasias.

Otorrinolaringología: sinusitis, amigdalitis, otitis, faringitis, anginas, etc.

Aparato Digestivo: colecistitis, colangitis, tifoidea, paratifoidea, abscesos, perianales, fistulas.

Genito-Urinas: cistitis, pielonefritis, pielitis, uretritis gonococcicas o inespecificas, prostatitis, anexitis, endometritis, vulvovaginitis.

Piel y Tejidos blandos: forunculosis, erisipela, piodermis, abscesos y procesos flemososos, impetigo.

Infecciones de diversas etiologías como ser: abscesos radicales, osteítis, periodontitis, gingivitis, alveolitis, tratamientos pre y post quirúrgicos.

En Odontología: procesos infecciosos de la esfera bucodentaria producidos por gérmenes sensibles a la Amoxicilina.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con infecciones por herpes virus, mononucleosis infecciosa. Pacientes con antecedentes de alergia general y de colitis ulcerosa o disfunción renal. También está contraindicado en pacientes tratados con Allopurinol (aumenta las posibilidades de reacciones alérgicas cutáneas). No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a la droga. No usar en periodo de lactancia. Embarazo (Cat: B).

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Puede producir reacciones dérmicas como eritemato maculopapulosas urticarianas, mononucleosis infecciosas o disfunción renal. Estas manifestaciones son reversibles y desaparecen con la interrupción del tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Interfieren en los efectos bacteriostáticos de la Amoxicilina, el Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfamidas o Tetraciclinas.

Puede disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La acción bactericida depende de su capacidad para alcanzar y unirse a las proteínas que ligan penicilinas localizadas en las membranas citoplasmáticas bacterianas.

Actúa por inhibición de la biosíntesis de mucopéptidos en la pared bacteriana en la fase de multiplicación activa; produce lisis y elongación de las bacterias sensibles, en particular las que se dividen rápidamente.

Se distribuye en la mayoría de los líquidos corporales y los huesos. Su absorción oral es de 75 a 90%, la que no es afectada por los alimentos y su unión a las proteínas es baja, 60% se metaboliza en el hígado y 68% de la droga inalterada se excreta por vía renal, en la bilis es de 5 a 10%. La amoxicilina atraviesa la barrera placentaria y se excreta en la leche.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Este medicamento contiene sacarosa, los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción de glucosa o galactosa, insuficiencia de sacarosa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento.

En raras ocasiones puede producirse trastornos dispépticos (vómitos, diarreas, flatulencia). Los cuales desaparecen al interrumpir la medicación.

RESTRICCIONES DE USO

Debe evitarse su uso durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, a menos que se considere esencial su uso por el médico tratante.

PREPARACION DE LA SUSPENSION

Agregar agua potable hasta el nivel de la flecha indicada en la etiqueta. Tapar y agitar enérgicamente hasta conseguir una suspensión homogénea. Verificar que dicho nivel se mantenga, caso contrario completar nuevamente con agua. **AGITAR ANTES DE USAR.**

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Novamox Duo 875 Comprimidos:

Como posología media de orientación se aconseja en adultos y niños de 12 años 1 comprimido cada 12 horas. Cuando la severidad del cuadro infeccioso así lo amerite puede utilizarse 1 comprimido cada 8 horas.

Novamox Duo 1000 Suspensión:

Como posología media de orientación se aconseja en niños de 3 a 10 años una dosis de 5 mL (1 gramo de amoxicilina) cada 12 horas. En las infecciones rebeldes y severas el médico puede indicar dosis de hasta cada 8 horas.

SOBREDOSIS

La Amoxicilina es un antibiótico poco tóxico, pero en concentraciones muy grandes son neurotóxicas, los síntomas son: cefaleas, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, cianosis, caída de la presión sanguínea, convulsiones, granulocitopenia y hepatitis. El tratamiento consiste en disminuir la dosis o suprimir el tratamiento. **En caso de sobredosis o intoxicación accidental llamar al centro de Toxicología de emergencias medicas. Teléfono. 220.418/9.**

PRESENTACIONES

NOVAMOX DUO 875

Caja conteniendo 15 comprimidos recubiertos.

NOVAMOX DUO 1000

Caja conteniendo 1 frasco c/ polvo para reconstituir 50 mL de suspensión extemporánea.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.

Cert. N° 15392-02-EF - NOVAMOX DUO 875

Cert. N° 14725-03-EF - NOVAMOX DUO 1000

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C (El Polvo y el comprimido).

Una vez reconstituida la suspensión, el tiempo de validez

del producto es de 7 días y debe ser almacenada

en un lugar refrigerado entre 2 °C y 8 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laranco - Reg. N° 2337

Venta bajo receta simple archivada

Industria Paraguaya

Guayaki®



división **Salud Humana**

Elaborado por **GUAYAKI S.A.**
División Salud Humana



Ofic. Administ.: Av. Brasilía N° 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay