

Penbiotic® Retard

PENICILINA G. BENZATINICA

1.200.000 Y 2.400.000 U.I.

ANTIBIOTICO

**POLVO ESTÉRIL PARA PREPAR UNA
SUSPENSIÓN INYECTABLE**
V.A.: I.M.

FORMULAS

PENBIOTIC RETARD 1.200.000

Cada frasco ampolla contiene:

Penicilina G. Benzatínica.....1.200.000 U.I.

Solvente x 5 mL

Cada ampolla contiene:

Lidocaína HCl.....4 mg

Agua p/ Inyectable c.s.p.....1 mL

PENBIOTIC RETARD 2.400.000

Cada frasco ampolla contiene:

Penicilina G. Benzatínica.....2.400.000 U.I.

Solvente x 10 mL

Cada ampolla contiene:

Lidocaína HCl.....4 mg

Agua p/ Inyectable c.s.p.....1 mL

ACCION TERAPEUTICA

Antibiótico de pequeño espectro de acción bactericida sistémica.

PROPIEDADES

PENBIOTIC RETARD, es un antibiótico natural, betalactámico, bactericida, con acción a nivel de la pared bacteriana. La penicilina G. Benzatínica es principalmente activa contra los cocos Gram (+), como estreptococos, meningococo, neumococo, etc., actuando también contra microorganismos Gram (-) como ser la Neisseria y algunos anaerobios.

INDICACIONES

PENBIOTIC RETARD, está indicado en todas las afecciones que requieren terapia penicilínica en dosis prolongadas, como tratamiento en los estados crónicos de gonorrea, sífilis, fiebre reumática, amigdalitis, faringitis, etc. Además está indicado como profiláctico de infecciones secundarias, como amigdalectomías, cirugía bucal, endocarditis, piodermis y erisipela a repetición.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las penicilinas.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Reacciones alérgicas de distintos tipos: Generalizadas (Shock anafiláctico, edema angioneurítico) y localizadas (dermatopatías, nefritis e intersticial).

Hipersensibilidad cruzada con otros antibióticos betalactámicos.

Granulocitopenia. Anemia hemolítica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Los antibióticos macrólidos, los bacteriostáticos, así como las cefalosporinas, antagonizan el efecto bactericida de las penicilinas, si se administran conjuntamente.

Las penicilinas reducen el efecto de los anticoagulantes orales. En asociación con el probenecid, existe un aumento de los niveles plasmáticos y de la vida media de las penicilinas.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La Penicilina G Benzatínica, actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, impidiendo el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglucanos, necesarios para la fuerza y rigidez de la pared celular bacteriana.

Tiene amplia distribución en todo el organismo, se distribuye en la mayoría de los líquidos corporales y los huesos, atraviesa la placenta y aparece en la sangre del cordón y líquido amniótico. Se elimina principalmente por el riñón, pero en una pequeña parte por la bilis y otras vías.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe ser utilizado por pacientes que presenten hipersensibilidad a la droga, en ciertos casos tras la administración del PENBIOTIC RETARD, se presentan reacciones alérgicas y en algunos casos shock anafiláctico.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

PENBIOTIC RETARD, es de uso exclusivamente intramuscular.

No debe ser utilizado por vía endovenosa, ni intratecal.

Modo de uso y dosis recomendada:

El polvo debe ser reconstituido con el solvente. La suspensión debe ser administrada de inmediato después de su reconstitución, agitando energicamente el frasco ampolla antes de aspirar la dosis. Desechese cualquier porción no utilizada.

Adminístrese por inyección intramuscular profunda en el cuadrante superior externo del glúteo, utilizando aguja Nº 18 a 20, de 1½ pulgadas de longitud. Se debe proceder con cuidado para evitar la administración intravenosa o intraarterial o la inyección cerca de los nervios periféricos importantes, pues puede producir lesión neuromuscular. no debe mezclarse con otras soluciones intravenosas. Antes de inyectar la dosis se debe aspirar para asegurar que el bisel de la aguja no este dentro del vaso sanguíneo.

Adultos: Dosis usual faringitis por estreptococo betahemolítico: 1.200.000 U.I. Como dosis única por vía intramuscular. Profilaxis de la fiebre reumática 1.200.000 U.I. una vez por mes.

Sífilis (primaria, secundaria, latente) 2.400.000 U.I. Como dosis única. Sífilis (terciaria y neurosífilis) 2.400.000 U.I. una vez por semana durante tres semanas por vía intramuscular.

La dosis se ajusta según criterio médico.

RESTRICCIONES DE USO

La penicilina debe emplear con precaución en individuos con historia de alergias significativas y/o asma.

Este fármaco deberá usarse durante el embarazo solamente que exista una indicación precisa.

La Penicilina G. Benzatínica soluble es excretada en la leche materna. Se debe proceder con precaución al administrar Penicilina G. Benzatínica en una mujer embarazada.

SOBREDOSIS

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación:

La penicilina en una sobredosis tiene el potencial de causar hiperirritabilidad neuromuscular y crisis convulsivas.

En caso de intoxicación o sobredosis, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACIONES

PENBIOTIC RETARD 1.200.000

Caja conteniendo 1 frasco ampolla + solvente de Lidocaína HCl x 5 mL.

HOSPITALAR: Caja conteniendo 100 frascos ampollas.

PENBIOTIC RETARD 2.400.000

Caja conteniendo 1 frasco ampolla + solvente de Lidocaína HCl x 10 mL.

HOSPITALAR: Caja conteniendo 100 frascos ampollas.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del

M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 07806-05-EF (1.200.000 U.I.)

07867-04-EF (2.400.000 U.I.)

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C (El polvo)

Una vez reconstituido, el producto debe ser de uso inmediato

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta Bajo Receta Simple Archivada

Industria Paraguaya

Guayaki 
Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administ.: Av. Brasilía Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay