



PARACETAMOL - ETER GLICERIL GUAYACOL BROMHEXINA HCl

**ANALGESICO - ANTIPIREITICO
EXPECTORANTE
BALSAMICO - MUCOLITICO**

V.A.: RECTAL

FORMULA

Cada supositorio contiene:

Paracetamol.....	300 mg
Eter Gliceril Guayacol.....	30 mg
Bromhexina HCl.....	4 mg
Excipientes c.s.p.....	1 supositorio

ACCION TERAPEUTICA

Analgésico, Antipirético, Expectorante, Secretolítico, Balsámico, Mucolítico.

PROPIEDADES

GRIFINIL supositorio actúa mediante la efectiva acción combinada de sus componentes sobre las diversas afecciones del aparato respiratorio, con efecto expectorante, balsámico, fluidificante y mucolítico. Baja la fiebre y calma el dolor.

INDICACIONES

GRIFINIL supositorio está indicado en todos los procesos en la cual las vías respiratorias son afectadas: cuadros gripales, bronquitis, tos, catarros y fiebre. Útil en el tratamiento sintomático de afecciones de vías respiratorias altas incluyendo faringitis, laringitis, bronquitis, traqueítis, traqueobronquitis.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

En pacientes alérgicos a la aspirina, el paracetamol puede producir reacciones alérgicas tipo bronco espasmo. En raras ocasiones se presentan erupciones cutáneas y otras reacciones alérgicas. Pueden observarse irritación perianal y deposiciones diarreicas, que ceden al suspender el tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar los efectos terapéuticos y también los tóxicos.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

El Paracetamol, su efecto antifebril es ejercido mediante la acción directa sobre el centro hipotalámico regulador del calor para bloquear los efectos de pirógenos endógenos. Esto produce aumento de la evaporación del calor a través de la sudoración y vasodilatación. Su acción analgésica está en relación con la elevación del umbral del dolor.

El paracetamol se absorbe rápida y completamente por vía oral, y bastante bien por vía rectal, teniendo la ventaja de evitar el primer paso hepático. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en 0,5-2 horas. El paracetamol se distribuye rápidamente por todos los tejidos. La tasa de unión a las proteínas plasmáticas es baja.

La biodisponibilidad es muy elevada (cerca del 100 %). El paracetamol se metaboliza principalmente a nivel del hígado.

La eliminación es principalmente urinaria. El 90% de la dosis la elimina el riñón en 24 horas. Menos del 5% se elimina sin modificar.

La Bromhexina, fluidifica las secreciones por fragmentación de los mucopolisacáridos ácidos con lo que facilita la expectoración. Es bien absorbida en el tracto gastrointestinal, se elimina por orina y por las heces. La Bromhexina ayuda a los mecanismos naturales del cuerpo para limpiar la mucosidad de las vías respiratorias.

Es Secretolítico: es decir, aumenta la producción de moco seroso en el tracto respiratorio y hace que la flema sea delgada y menos pegajosa. Esto contribuye a un efecto secretomotor: ayuda a los cilios a transportar la flema de los pulmones.

El Guayacol, actúa como antiséptico pulmonar. El guayacol es un fenol que proviene de la creosota. Tiene acción expectorante, aumenta las secreciones del tracto respiratorio mediante un mecanismo reflejo, lo que da por resultado el aumento y fluidificación de la expectoración. Se absorbe bien por cualquier vía de administración y se elimina por la orina. El éter gliceril guayacol o guaifenesina es una sustancia semisintética capaz de aumentar las secreciones del tracto respiratorio en un 121%.

RESTRICCIONES DE USO

No usar en pacientes con diarrea o irritación en el lugar a ser administrada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Puede causar irritación en la zona aplicada, la cual desaparece suprimiendo el uso del mismo.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO

Salvo prescripción facultativa.
Niños: 1 supositorio cada 8 a 12 horas.

SOBREDOSIS

Ante cualquier sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 10 supositorios.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 10442-03-EF

Conservar en la heladera entre 2°C y 8°C
Mantener fuera del alcance de los niños
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.
División Salud Humana



Ofic. Administr.: Av. Brasilía Nº 1895
Tel.: 291-339
Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416
Tel.: 290-822
Asunción - Paraguay