

RESTRICCIONES DE USO

Debido a sus efectos sobre receptores GABA-érgicos en el cerebro, la ivermectina está restringida en pacientes con meningitis u otras afecciones del sistema nervioso central que pueden afectar la barrera hematoencefálica. La ivermectina debe ser evitada en la gestación, durante la lactancia y en niños con menos de 15 kg de peso. Igual cuidado se observará en pacientes que usan drogas que deprimen el sistema nervioso central.

SOBREDOSIS

Los signos y síntomas de una intoxicación son: sarpullido, urticaria, convulsiones, dolor de cabeza, hormigueo en pies o manos, debilidad, pérdida de coordinación, dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, mareos, hinchazón de cara, brazos, manos, pies, tobillos o pantorrillas. Tratamiento: se recomienda inducir el vómito y/o aplicar lavado gástrico tan pronto como sea posible. Si las condiciones del paciente lo requieren administrar líquidos y electrolitos parenterales y ventilación mecánica.

En caso de sobredosis llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

Este medicamento se encuentra bajo Farmacovigilancia Intensiva. Ante sospecha de aparición de Reacciones Adversas tras la administración del medicamento es obligatoria la notificación a través de la página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: <https://www.mspbs.gov.py> Click en: "Reporte de Reacciones Adversas a Medicamentos". Esto agilizará la detección de nueva información sobre la seguridad del medicamento.

Para más informaciones:

farmacovigilancia.dnvs@mspbs.gov.py

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 1 blister x 10 comprimidos.

Caja conteniendo 1 blister x 4 comprimidos.

Caja conteniendo 100 blister x 10 comprimidos.

(Presentación Hospitalar).

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P y B.S. Cert. N° 16415-03-EF
Registro Sanitario en Bolivia N°: II-73589/2020

Mantener a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. N° 4468

**Venta Bajo Receta Simple Archivada
Industria Paraguaya**

Ofic. Administr.: Av. Brasilía N° 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay

Ivermectina® 6 mg Guayaki

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO

COMPRIMIDOS - V.A.: ORAL

FORMULA

Cada comprimido contiene:

Ivermectina.....6 mg

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

ACCION TERAPEUTICA

Antiparasitario de amplio espectro.

PROPIEDADES

La Ivermectina forma parte de los antiparasitarios que actúan sobre los nervios y las células musculares del parásito.

Es un tipo de avermectinas: clases de agentes antiparasitarios de amplio espectro, los cuales derivan de la fermentación del organismo streptomyces avermitilis presente en el suelo.

Antiparasitario activo sobre helmintos, nematodos y artrópodos (garrapatas y ácaros). Agonista potente del GABA, determina la parálisis del parásito. No atraviesa la barrera hematoencefálica.

INDICACIONES

Oncocercosis sospechada o diagnosticada a O. volvulus.

Tratamiento por vía oral de la sarna (escabiosis), filariasis, nematodos intestinales (ascaridiasis) y oncocercosis (etapa larvaria). Tratamiento de segunda elección para strongyloides stercoralis (únicamente etapa intestinal).

CONTRAINDICACIONES

Debido a sus efectos sobre receptores GABA-érgicos en el cerebro, la ivermectina está contraindicada en pacientes con meningitis u otras afecciones del sistema nervioso central que pueden afectar la barrera hematoencefálica.

La ivermectina debe ser evitada en la gestación, durante la lactancia y en niños con menos de 15 kg de peso. Igual cuidado se observará en pacientes que usan drogas que deprimen el sistema nervioso central. Informe a su medico si padece de asma, problemas hepáticos. o presenta una reacción alérgica o inusual a la ivermectina, a otros medicamentos, alimentos, colorantes o conservantes.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Reacciones de hipersensibilidad debida a la liberación de antígenos de las microfilarias muertas, incluyendo prurito, conjuntivitis, artralgia, mialgia, fiebre, linfadenitis, adenopatías, náuseas, vómitos, diarrea, hipertensión ortostática, astenia, erupción y cefaleas. Con menos frecuencia se observa sensación anormal en los ojos, edema papilar.

Gratipack. Tel.: 955 915



Guayaki®

Elaborado por GUAYAKI S.A.