

Penbiotic® Bronquial

PENICILINA G. PROCAINA - PENICILINA G. SODICA
ANTIBIOTICO - MUCOLITICO
Polvo estéril para suspensión inyectable
V.A.: I.M.

FORMULA

Cada frasco ampolla contiene:

Penicilina G Procaína.....400.000 U.I.
Penicilina G Sódica.....200.000 U.I.

Cada solvente c/ Bromhexina contiene:

Bromhexina.....4 mg
Agua para inyectable c.s.

Cada solvente c/ Lidocaína contiene:

Lidocaína HCl.....4 mg
Agua para inyectable c.s.

ACCION TERAPEUTICA

Antibiótico - Mucolítico.

PROPIEDADES

Las Penicilinas se caracterizan por ser potentes bactericidas, tener amplio espectro, tener buena difusión tisular sobre todo a nivel pulmonar, escasa irritación y resistir a la inactivación bacteriana.

INDICACIONES

Bronquitis agudas, Bronconeumonías, Neumonías, Abscesos pulmonares, Asma complicado, Bronquiectasias, Síndrome gripales con complicaciones infecciosas broncopulmonares, y en general indicado específicamente para todas las patologías infecciosas broncopulmonares, cuyo causante sean gérmenes sensibles a la asociación Penicilina - Bromhexina.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las penicilinas o cefalosporinas.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Dolor en el sitio de la inyección, en pacientes sensibles a los antibióticos del núcleo B-lactámico, pueden presentarse urticaria, eritemas multiformes, erupciones maculopapulosas y en casos graves, anafilaxia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Evitar el uso simultáneo con otros Aminoglucosidos.

El Probenecid aumenta los niveles séricos de la droga por disminución de su excreción renal.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

Las Penicilinas inhiben la síntesis del péptido-glicano o mureína de la pared bacteriana, produce lisis y elongación de las bacterias sensibles. Se absorbe total y rápidamente por vía intramuscular.

Se distribuye principalmente en el líquido extracelular, excepto a nivel cerebral, atraviesa la placenta.

Su unión a las proteínas es baja o moderada y no se metaboliza, de 80% a 98% se excreta por vía renal y el 1% por la bilis.

La Bromhexina, cuya acción es fluidificar las secreciones por fragmentación de los mucopolisacáridos ácidos con la cual facilita la expectoración. Su acción máxima se observa a los 2 a 3 días.

Se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, sufre una biotransformación compleja por hidroxilación, demetilación y ciclización, se excreta por orina y heces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a las Penicilinas.

Debe administrarse con precaución en pacientes con trastornos renales. Embarazo (Cat: B). Miastenia gravis. Lactancia (escasa secreción por la leche).

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Adultos: Salvo indicación facultativa: Aplicar 1 o 2 frascos ampollas por vía intramuscular profunda por día.

Niños de 5 a 10 años: aplicar 1/2 a 1 ampolla por vía I.M. por día.

MODO DE USO: mezclar el solvente con Bromhexina con el polvo en el frasco ampolla. Agitar bien. Agregar luego el solvente indoloro con Lidocaína HCl. Agitar bien e inyectarlo por vía intramuscular profunda.

AGITAR ANTES DE USAR.

RESTRICCIONES DE USO

Pacientes alérgicos a los principios activos.

SOBREDOSIS

La penicilina es un antibiótico poco tóxico, pero en concentraciones muy grandes son neurotóxicas, los síntomas son cefalea, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, cianosis caída de la presión sanguínea, convulsiones, granulocitopenia y hepatitis. La Bromhexina es poco tóxica, pero puede producir ardor epigástrico, náuseas, mares y sudoración. El tratamiento a seguir es sintomático y de mantenimiento. La hemodiálisis puede ayudar a eliminar esta droga de la sangre. En caso de intoxicación y sobredosis, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 frasco ampolla + 1 solvente con Bromhexina + 1 solvente con Lidocaína HCl.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N°: 11935-02-EF

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. N° 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya

Guayaki®



División **Salud Humana**

Elaborado por **GUAYAKI S.A.**
División Salud Humana



Ofic. Administ.: Av. Brasilia N° 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay