

Paralergim®

LORATADINA 10 mg
LORATADINA 100 mg

ANTI-HISTAMINICO

COMPRIMIDOS - JARABE

V.A.: ORAL

FORMULA

COMPRIMIDOS

Cada comprimido contiene:

Loratadina.....10 mg
Excipientes c.s.p.....1 comp.

JARABE

Cada 100 mL contiene:

Loratadina.....100 mg
Excipientes c.s.p.....100 mL

ACCION TERAPEUTICA

Antihistamínico.

PROPIEDADES

Paralergim (Loratadina) es un antialérgico de acción inmediata, siendo un antihistamínico tricíclico potente, tiene además acción prolongada con actividad selectiva, antagonista, de los receptores H1 periféricos.

INDICACIONES

Paralergim esta indicado en el tratamiento de síntomas asociados de diversas afecciones tales como: Rinitis aguda y vasomotora, polinosis, conjuntivitis alérgicas, dermatitis por contacto, dermatosis alérgicas, urticarias crónica, reacciones alérgicas por picaduras de insectos, afecciones respiratorias con componentes alérgicos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o idiosincrasia conocida a la LORATADINA. La pequeña actividad anticolinérgica de las antihistaminas H1 puede resultar en un espesamiento de las secreciones bronquiales agravando los ataques agudos de asma. Sin embargo esta actividad anticolinérgica no excluye el uso de antihistamínicos en enfermos asmáticos, en particular cuando se usa fármacos como la loratadina con un mismo componente anticolinérgico.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

La somnolencia y/o la sedación son los efectos secundarios más frecuentes de los antihistamínicos H1. Se ha observado somnolencia en 8% de los pacientes tratados con loratadina frente al 6% en los tratados con placebo. En un 4% de los casos, se ha observado fatiga.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La administración de PARALERGIM debe suspenderse aproximadamente 48 horas antes de efectuarse cualquier prueba cutánea de alergia, ya que los antihistamínicos pueden impedir o disminuir las reacciones que de otro modo serían positivas a los indicadores de reactividad dérmica.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La Loratadina bloquea selectivamente los receptores H1 de HISTAMINA que se encuentran en la periferia, y al mismo tiempo disminuye la producción y liberación de HISTAMINA y LEUCOTRIENOS a nivel de los mastocitos.

Se metaboliza por completo en el hígado. Se elimina por vía renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No se aconseja utilizar durante el embarazo. La seguridad de la loratadina no ha sido establecido aún en niños menores de 2 años.

En ancianos mayor sensibilidad a las reacciones adversas. Lactancia, pasa a la leche materna. Insuficiencia hepática o renal. Administrar día de por medio. No se hemodializa.

RESTRICCIONES DE USO

No usar durante el primer trimestre del embarazo y en pacientes con problemas de hipersensibilidad al principio activo. Insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Administrar cada 48 horas. Pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la IMAO, o dentro de las dos semanas de haberse suspendido la administración. Glaucoma con ángulo estrecho.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido o 10 mL de jarabe en una sola toma al día.

Niños menores de 12 años con peso igual o superior a 30 kg: 1 comprimido o 10 mL de jarabe en una sola toma al día.

Niños con peso inferior a 30 kg: medio comprimido o 5 mL de jarabe en una sola toma al día.

Paralergim puede ser administrado a cualquier hora del día debido a que su absorción es independiente a la ingesta de alimentos.

SOBREDOSIS

En caso de intoxicación o sobredosis accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 10 comprimidos.

Caja conteniendo 20 comprimidos.

Caja conteniendo frascos x 100 y 150 mL

Hospitalar: Caja conteniendo 25 frascos x 100 mL

Hospitalar: Caja conteniendo 25 frascos x 150 mL

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 12959-03-EF - Comprimidos
13257-03-EF - Jarabe

Mantener a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. N° 4468

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administr.: Av. Brasilia N° 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay