

# ContraTos®

## PEDIATRICO

### AMBROXOL HCl 15 mg

### MUCOLITICO

### JARABE - V.A.: ORAL

#### FORMULA

Cada 5 mL contiene:

Ambroxol Clorhidrato.....15 mg  
Excipientes c.s.p.....5 mL

#### ACCION TERAPEUTICA

Mucolítico.

#### PROPIEDADES

**CONTRATOS PEDIATRICO** es un mucolítico estimulante del transporte mucociliar. Contribuye a disminuir la viscosidad de la secreción del moco bronquial.

#### INDICACIONES

**CONTRATOS PEDIATRICO** está indicado en el tratamiento de afecciones bronco pulmonares que cursan con secreciones bronquiales muy viscosas asociadas con tos productiva.

Está indicado en: bronquitis aguda, bronquiectasias, pacientes traqueotomizados, bronquitis crónicas, neumonías, bronquitis asmático, bronconeumonía, bronquitis tabaquica, bronquitis del pre operado y post operado; tratamiento de la permeabilidad de la vía aérea del paciente crítico.

#### CONTRAINDICACIONES

Primer trimestre del embarazo. Úlcera péptica en actividad. No es aconsejable en pacientes que reciben depresores del sistema nervioso central.

#### REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Las más frecuentes son: náuseas, vómitos, epigastralgias que se presentan a dosis elevadas.

#### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La administración de ambroxol eleva la concentración de antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, eritromicina, doxiciclina) en el tejido broncopulmonar y en el esputo.

#### MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

Rompe los enlaces de unión de los mucopéptidos, produciendo una fluidificación de las secreciones viscosas y adherentes del tracto respiratorio.

Estimula la secreción de sustancias líquidas por parte de las glándulas submucosas bronquiales.

Estimula la mucocinesis del epitelio bronquial.

Estimula la formación de líquido surfactante pulmonar.

Permite una mejor difusión de los antibióticos al sitio de la infección.

#### Farmacocinética

Se absorbe bien por vía oral, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Por su acción secretagoga se debe tener cautela en cuadros canaliculares respiratorios con componente obstructivo (asma bronquial, bronquitis crónicas, enfisema) así como en niños y lactantes por la posibilidad de impactación de moco en la vía aérea distal, con el agravamiento del componente obstructivo.

#### POSOLOGIA Y MODO DE USO

Niños menores de 2 años: 2,5 mL, cada 12 horas.

Niños de 2 a 6 años: 2,5 mL, cada 8 horas.

Niños de 6 a 12 años: 5 mL, cada 8 horas.

SABOR FRUTILLA.

#### SOBREDOSIS

En caso de intoxicación llamar al centro de toxicología de emergencias médicas. Teléfono: 220.418

#### PRESENTACION

Caja conteniendo frasco x 100 mL.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 15723-02-EF

Conservar el frasco bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar fresco. Protéjase de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Regente:** Q. F. Lina Laratro - Reg. N° 2337

**VENTA BAJO RECETA**

**Industria Paraguaya**



Elaborado por GUAYAKI S.A.  
División Salud Humana



Ofic. Administr.: Av. Brasilía N° 1895  
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay