

Digesplen® A.G.

METOCLOPRAMIDA HCl - SIMETICONA NORMALIZADOR DIGESTIVO ANTIEMETICO - CARMINATIVO ANTIFLATULENTO SUSPENSION GOTAS V.A.: ORAL

FORMULA

Cada 1 mL contiene:

Metoclopramida HCl	4 mg
Simeticona.....	40 mg
Excipientes c.s.p.....	1 mL

ACCION TERAPEUTICA

Normalizador digestivo - Antiemético - Carminativo - Antiflatulento.

PROPIEDADES

La Metoclopramida, tiene acción estimulante motora que se ejerce especialmente sobre el estómago, aumenta el peristaltismo gástrico y acelera el tránsito en el intestino delgado, pero no en el colon, de manera que se produce una rápida evacuación gástrica, pero no diarrea. Posee acción antieméticas en una serie de estados incluidos los vómitos del embarazo y los post-operatorios.

La Simeticona, hace posible la ruptura de las burbujas gaseosas del tracto digestivo (estómago e intestino delgado), de este modo hace posible la eliminación de los gases en forma de eructos y flatos desapareciendo las molestias y trastornos digestivos de origen flatulentos.

INDICACIONES

Está indicado en las dispepsias gástricas, distensión abdominal, plenitud post-prandial, ardor epigástrico, náuseas, pirosis, regurgitación esofágica, incluyendo las gastritis crónicas, afecciones biliares con repercusión gastroduodenal, vómitos, flatulencia, aerofagia, distensión y dolores abdominales post-operatorios, eliminación de gases previos a los estudios radiológicos del aparato digestivo y vías biliares.

CONTRAINDICACIONES

Alergia al fármaco. Extrapiramidalismo medicamentoso. Insuficiencia renal grave.

Hemorragia digestiva, obstrucción mecánica, feocromocitoma, hepatopatía crónica descompensada.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Las reacciones adversas más frecuentes son: inquietud, somnolencia, cansancio y laxitud, que se presentan en aproximadamente el 10% de los pacientes. Con menos frecuencia pueden aparecer insomnio, cefalea, mareos, náuseas, síntomas extrapiramidales, galactorrea, ginecomastia, rash, urticaria o trastornos intestinales.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso simultáneo con alcohol puede aumentar los efectos depresores del S.N.C. Los medicamentos que contienen opiáceos pueden antagonizar los efectos de la Metoclopramida sobre la motilidad gastrointestinal. Acelera el vaciado gástrico de la Levodopa, aumentando de esta forma el grado de absorción desde el intestino delgado y acelera la absorción de Mexiletina.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La Metoclopramida es un antiemético y proquinético. Posee acción antidopaminérgica D2 central y periférica y a altas dosis acción antagonista 5-HT3, por lo que posee actividad antiemética frente a vómitos de diversas etiologías.

Aumenta la liberación de acetilcolina del plexo mientérico. Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, la peristalsis y el vaciamiento gástrico.

Su unión a las proteínas plasmáticas es de (13 a 22%), se metaboliza en el hígado, tiene vida media de 4 a 6 horas, se elimina por vía renal, 85% de la dosis oral aparece en la orina como fármaco inalterado y como sulfatos glucoronidos conjugados.

La Simeticona, actúa dispersando y previniendo la formación de burbujas de gases rodeadas de mucosidades reduciendo la tensión superficial de las burbujas. Se trata de un agente antiespumante.

Es insoluble en agua y en lípidos, por lo que no es absorbida en el tracto digestivo y se eliminan con las heces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se deberá tener precaución si se ingieren bebidas alcohólicas u otros depresores del S.N.C. Como también si aparece somnolencia durante la medicación. En los ancianos es más común la aparición de efectos extrapiramidales. Se deberá analizar la relación riesgo- beneficio durante el período de lactancia ya que se excreta en la leche materna.

RESTRICCIONES DE USO

Intolerancia al medicamento. Enfermedad de Parkinson e insuficiencia renal crónica severa.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Lactantes: 5 gotas hasta 4 veces al día.

Niños de 5 a 10 años: 15 a 30 gotas hasta 4 veces al día.

Adultos: 30 a 50 gotas 4 veces al día.

SOBREDOSIS

En casos de sobredosis o intoxicación se exacerban los síntomas de reacciones adversas como ser: depresión, insomnio, confusión, desorientación e incluso alucinaciones. También pueden aparecer espasmos musculares, tic, efectos extrapiramidales (temblores y sacudidas de las manos). Si aparecen estos síntomas llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo frasco gotero x 15 mL.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P y B.S. Certif. N°: 05661-05-EF

Mantener a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. N° 4468

Venta bajo receta

Industria Paraguaya

Elaborado por GUAYAKI S.A.



Ofic. Administr.: Av. Brasil 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay