

# Contratos® Plus

## AMBROXOL - OXOLAMINA EXPECTORANTE - MUCOLITICO ANTITUSIVO - ANTIINFLAMATORIO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS JARABE - V.A.: ORAL

### FORMULA

Cada 5 mL contiene:

Ambroxol HCl.....	5 mg
Oxolamina Fosfato.....	50 mg
Excipientes c.s.p.....	5 mL

### ACCION TERAPEUTICA

Expectorante - Mucolítico - Antitusivo - Antiinflamatorio de las vías respiratorias.

### PROPIEDADES

**CONTRATOS PLUS**, posee en su formulación el Ambroxol, mucocinético selectivo y la Oxolamina, antitusivo con propiedades antiinflamatorias y descongestivas del tracto respiratorio superior e inferior.

### INDICACIONES

En todos los cuadros respiratorios de las vías respiratorias superiores e inferiores como ser: Tos, catarros, laringitis, bronquitis agudas y crónicas. Traqueobronquitis, neumonías, tos del fumador, traqueítis y laringitis.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los principios activos.  
Primer trimestre del embarazo. Úlcera péptica en actividad.

### RESTRICCIONES DE USO

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a la droga. No usar en período de lactancia. Embarazo (Categoría B).

### REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

En algunos casos pueden presentarse trastornos gastrointestinales como ser: Náuseas, pirosis, diarreas. Adormecimiento de la mucosa bucal.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Con la administración simultánea de antipiréticos como ser: Paracetamol, ibuprofeno, dipirona, puede potenciar la aparición de los trastornos gastrointestinales.

### MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La Oxolamina es un inhibidor del reflejo tusígeno que actúa a nivel periférico a diferencia de otros antitusígenos de acción central sobre el centro bulbar como la codeína, el dextrometorano, la noscapiña y otros opiáceos. Se administra por vía oral en forma de fosfato, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal.

El Ambroxol es un mucolítico estimulante de la secreción del moco bronquial y del transporte mucociliar. Se absorbe por vía oral y se elimina por vía renal.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Úlcera gastrointestinal. En niños puede provocar alucinaciones en casos aislados.

### POSOLOGIA Y MODO DE USO

En adolescentes y adultos: 10 mL (100 mg de Oxolamina Fosfato + 10 mg de Ambroxol) cada 6 u 8 horas.

Niños de 6 a 12 años: 5 mL cada 8 horas.

Menores de 6 años: usar bajo estricto cuidado del médico pediatra.

### SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o intoxicación accidental, recurrir al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

### PRESENTACION

Caja conteniendo frasco x 120 mL.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 12590-03-EF

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administr.: Av. Brasilia Nº 1895  
Tel.: 291-339  
Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416  
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay