

# Oraferrol®

## SULFATO FERROSO 200 mg ANTIANEMICO CAPSULAS V.A.: ORAL

### FORMULA

Cada cápsula contiene:

Sulfato Ferroso.....200 mg  
(Equivalente a 73 mg Fe++ )  
Excipientes c.s.p.....1 cápsula

### ACCION TERAPEUTICA

Antianémico.

### PROPIEDADES

**ORAFERROL** por su contenido de hierro ejerce una potente acción en las anemias ferroprivas. En anemia microcíticas hipocrómicas, la administración de hierro produce un aumento del porcentaje de reticulocitos, normalizándose luego el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración hemoglobínica corpuscular media, traduciendo esto en una rápida mejoría sintomática con desaparición de la palidez, inapetencia, diarrea, palpitations si existen.

### INDICACIONES

**ORAFERROL** está indicado en anemias por deficiencia de hierro. Anemias por hemorragias crónicas. Estados donde aumenta el requerimiento de hierro (embarazo, lactancia). Profilaxis de la anemia durante las etapas de crecimiento de los adolescentes y en la mujer durante la fase de madurez sexual. En enfermedades infecciosas o tumorales crónicas, cuando existe déficit de hierro.

### CONTRAINDICACIONES

Anemias hemolíticas graves.

Administrar con precaución en pacientes con colitis ulcerosa, úlcera gastrointestinal y carcinoma hepático.

### REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Gastrointestinales: Por acción irritante, náuseas, vómitos y diarreas. Por acción astringente, constipación. Tiñe las heces de color negro.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Distintos alimentos disminuyen su absorción; es mejor administrarlo en ayunas o alejado de las comidas. Las tetraciclinas y los antiácidos disminuyen su absorción, mientras el ácido ascórbico la aumenta.

### MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

**Sulfato Ferroso**, se absorbe en el duodeno y yeyuno. La absorción es rápida, una vez absorbido pasa a la sangre, aumentando su concentración en el plasma sanguíneo, luego pasa a la médula osea para formar hemoglobina y a otros órganos donde se almacena.

Se elimina por las heces y en pequeñas cantidades por la bilis.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Tener precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal, neoplasma gástrico, colitis ulcerosa crónica, enfermedad de Crohn. La aclorhidria disminuye su absorción.

### RESTRICCIONES DE USO

Hipersensibilidad al hierro.  
Pacientes con sobrecarga de hierro.

### POSOLOGIA Y MODO DE USO

Salvo prescripción facultativa 1 a 2 cápsulas por día.

### SOBREDOSIS

En caso de intoxicación o sobredosis, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9

### PRESENTACION

Caja conteniendo x 30 cápsulas.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 07621-05-EF - Cápsulas

Mantener a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Regente:** Q. F. Sara Id - Reg. Nº 4468

**Venta bajo receta**

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administr.: Av. Brasilita Nº 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay