



Pediculosan®

DELTAMETHRIN 20 mg
PIRETROIDE CLASE IV - BAJA TOXICIDAD
PEDICULICIDA - PIOJICIDA
USO EXTERNO

FORMULA

Loción: Cada 100 mL contiene:
Deltamethrin.....20 mg
Excipientes c.s.p.....100 mL
Shampoo: Cada 100 mL contiene:
Deltamethrin.....20 mg
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Parasiticida de uso externo. Indicado específicamente para el tratamiento del pediculus. (Piojos de la cabeza, cuerpo o pubis y sus liendres (huevos).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Debe evitarse el contacto con los ojos, de producirse el mismo debe lavarse inmediatamente con abundante agua, de producirse el contacto en piel lavar con abundante agua y jabón.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

PEDICULOSAN LOCION-SHAMPOO, es de uso externo exclusivamente. En caso de ingestión accidental se recomienda no inducir al vomito.

Administrar carbón activado y avisar al médico lo antes posible.
Consultar en caso de intoxicación al centro nacional de toxicología (centro de emergencias médicas) Tel.: 204 800 R.A.
Aviso al médico: Producto moderadamente toxico, clase IV.
Aplicar tratamiento sintomatológico y realizar lavado gástrico.
Administrar diazepam en caso de convulsiones y atropina en caso de hipercolinergia.
Reanimación sintomático especialmente respiratoria.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Se recomienda el tratamiento mixto Loción - Shampoo.
Primera noche: Se recomienda aplicar pediculosan loción sobre la zona pilosa afectada mediante un masaje firme, no enjuagar (dejar la loción toda la noche).
Primera mañana: Lavar con pediculosan shampoo, usar un peine con dientes finos para extraer las liendres y enjuagar.
Segunda noche y Segunda mañana: Repetir el tratamiento anterior. Se recomienda repetir todo el tratamiento anterior a la 1 semana.

PRESENTACION

Caja conteniendo Loción: Frasco x 60 mL
Shampoo: Frasco x 60 mL

CONSEJOS UTILES PARA LA FAMILIA

1. Se debe aplicar Pediculosan Loción - Shampoo a toda la familia: padre, madre y hermanos del infectado el contagio es fácil y al comienzo pasa inadvertido.

2. Se debe lavar con agua caliente todos los elementos como peines, hebillas, etc. que tengan contacto con la cabeza por que allí los piojos pueden ocultarse.

3. Se debe avisar de inmediato en el centro educativo (colegios, escuelas, jardín de infantes) donde asiste el niño/a infectado para que todos realicen el tratamiento adecuado.

4. Se debe volver a realizar el mismo tratamiento con Pediculosan Loción - Shampoo a los siete días (1 semana) para eliminar los huevos de los piojos que hayan quedado y así prevenir nuevos contagios.

5. Se debe realizar revisiones de la cabeza de los niños en la casa periódicamente para controlar nuevas reinfecciones.

6. Se puede volver a utilizar Pediculosan Loción - Shampoo 1 vez al mes como medida preventiva evitando posibles contagios.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 06551-03-EF

Conservar a temperatura inferior a 30°C
Mantener fuera del alcance de los niños
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya

Guayaki®



división **Salud Humana**

Elaborado por **GUAYAKI S.A.**
División Salud Humana



Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339
Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416
Tel.: 290-822
Asunción - Paraguay