

Lambizol®

ALBENDAZOL 400 mg VERMICIDA - GIARDICIDA

SUSPENSIÓN AMPOLLAS BEBIBLES
V.A.: ORAL

FORMULA

SUSPENSIÓN AMPOLLAS BEBIBLES

Cada ampolla bebible x 10 mL contiene:

Albendazol.....400 mg
Excipientes c.s.p.....10 mL

ACCION TERAPEUTICA

Vermicida, giardicida.

PROPIEDADES

El Albendazol es un antihelmíntico bencimidazólico, que posee actividad frente a nematodos, cestodos y trematodos, también tiene efecto sobre la giardia duodenalis, causando la muerte del parásito, la muerte ocurre debido a que el parásito pierde su habilidad para adherirse a las vellosidades intestinales y así poder obtener nutrientes.

INDICACIONES

Oxiuriasis, ascariasis, anquilostomiasis, necatoriasis, trichuriasis, estrogiloidiasis, teniasis, imenodeliasis, parasitosis intestinales múltiples, hidatidosis, giardiasis. De elección, en los casos inoperables de quistes idatílicos en la profilaxis antes de la extirpación y en los casos de neurocisticercosis por larvas de *T. solium*. Comprobada eficacia en el tratamiento de giardiasis intestinal.

CONTRAINDICACIONES

No debe administrarse durante el embarazo ni en mujeres que se piensan estar embarazadas. Está contraindicado en pacientes con historia conocida de hipersensibilidad al fármaco. Este fármaco no ha sido estudiado en niños menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Vértigos, cefaleas, dolor epigástrico, boca seca, fiebre, prurito, vómitos y diarrea.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Tener cuidado al utilizar drogas que usen las mismas vías enzimáticas de metabolismo a nivel hepático, pues se pueden observar interferencias mutuas en la metabolización.

MECANISMO DE ACCION; FARMACOCINETICA

Su mecanismo de acción involucra ciertas alteraciones en la captación y utilización de los hidratos de carbono por el parásito.

La absorción digestiva del albendazol es moderada, por lo cual se lo esta utilizando en otras localizaciones parasitarias como ser: hidatidosis hepática y pulmonar. Una vez absorbido se transforma en su metabolito activo el sulfoxido de albendazol (vida media de 8,5 horas), que se excreta inalterado por vía digestiva por lo que el efecto antiparasitario se realiza en la luz intestinal y en el nivel sistémico. Presenta una unión protéica del 70%. La excreción se realiza por vía renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones. Evitar la administración durante períodos febriles. Tener en cuenta que pasa a la leche materna cuando se administra a mujeres en período de lactancia materna.

RESTRICCIONES DE USO

Este producto deberá utilizarse bajo prescripción y control médico. Se sabe que el Albendazol es teratogénico y embriotóxico en ratones y conejos, por tanto, no debe ser administrado durante el embarazo. En mujeres en edad fértil, debe administrarse dentro de los siete días del inicio de la menstruación o después de contar con una prueba negativa de embarazo y aconsejar tomar precauciones anticonceptivas durante un mes después de haber completado el tratamiento. Se desconoce si el Albendazol o sus metabolitos se secretan en la leche materna humana. Por lo tanto, el Albendazol no debe ser utilizado durante la lactancia a menos que se considere que los beneficios potenciales sobrepasan a los posibles riesgos asociados con el tratamiento.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

La dosis usual para adultos y niños mayores de 2 años es de 400 mg como dosis simple. En estrogiloidiasis se administran 400 mg diarios durante 3 días consecutivos

Giardiasis Adultos: 400 mg por día por 5 días.

Niños mayores de 2 años: 400 mg por día por 5 días (1 ampolla) por día, por 5 días.

Modo de uso: Ingerir las ampollas bebibles de preferencia luego de algún alimento rico en grasa para mejorar su absorción.

Agitar bien la ampolla antes de su uso. Se puede ingerir de forma directa por su agradable sabor a tutti frutti.

SOBREDOSIS

En caso de intoxicación o sobredosis, llama al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas teléfono 220 418/9 Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 5 ampollas bebibles x 10 mL.

Hospitalar: 100 ampollas bebibles x 10 mL

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 14423-03-EF - Ampollas Bebibles.

Mantener a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. N° 4468

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administr.: Av. Brasilia N° 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay