

Digesplen® 100

**METOCLOPRAMIDA HCl
SIMETICONA - ACIDO DESOXICOLICO
NORMALIZADOR DIGESTIVO - ANTIEMETICO
COLERETICO - ANTIPLATULENTO**

COMPRIMIDOS - V.A.: ORAL

FORMULA

Cada comprimido contiene:
Metoclopramida HCl.....10 mg
Simeticona.....100 mg
Acido desoxicólico.....30 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

ACCION TERAPEUTICA

Normalizador digestivo, antiemético, colerético, antiflatulento.

PROPIEDADES

DIGESPLEN 100 contiene metoclopramida cuya acción estimulante motora se ejerce especialmente sobre el estómago, aumenta el peristaltismo gástrico y acelera el tránsito en el intestino delgado, pero no en el colon, de manera que se produce una rápida evacuación gástrica pero no diarrea.

Posee acción antiemética en una serie de estados, incluidos los vómitos del embarazo y post-operatorios.

La Simeticona, es un derivado inerte derivada del silicio deprovida de acción sistémica que desarrolla un efecto espumolítico-antiflatulento.

El ácido desoxicólico posee acción digestiva y colerética, provoca la emulsión de las grasas (con lo que aumenta la actividad de la lipasa pancreática) y es necesario para una adecuada absorción de las grasas, colesterol y las vitaminas liposolubles A, D, E y K en forma de complejos solubles.

INDICACIONES

DIGESPLEN 100 está indicado en las dispepsias gástricas, distensión abdominal, plenitud post-prandial, ardor epigástrico, náuseas, pirosis, regurgitación esofágica, incluyendo las gastritis crónicas, afecciones biliares con repercusión gastrointestinal, vómitos, flatulencia, aerofagia, distensión y dolores abdominales post-operatorios, eliminación de gases previos a los estudios radiológicos del aparato digestivo y vías biliares.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en casos de epilepsia, hemorragia, obstrucción mecánica o perforación en el nivel gastrointestinal.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Son de incidencia rara pero pueden aparecer constipación, mareos, cefaleas, rash cutáneo, irritabilidad no habitual.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso simultáneo con alcohol puede aumentar los efectos depresores del S.N.C. Acelera el vaciado gástrico de la levodopa, aumentando de esta forma el grado de absorción desde el intestino delgado y acelera también la absorción de mexiletina.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La Metoclopramida, inhibe la relajación del músculo liso gástrico producida por la dopamina, potenciando la respuestas colinérgicas del músculo liso gastrointestinal. Acelera el tránsito intestinal y el vaciado gástrico, lo que impide la relajación del cuerpo gástrico y aumenta la actividad del antro.

Disminuye el reflejo hacia el esófago, con aumento de la presión de reposo del esfínter esofágico inferior y también de la amplitud de las contracciones peristálticas esofágicas. Se une a las proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal.

La Simeticona al actuar como un tensioactivo produce la ruptura de las burbujas gaseosas del estómago e intestino favoreciendo su eliminación y por consiguiente hace desaparecer las molestias y trastornos flatulentos, es insoluble en agua y en lípidos, por lo que no es absorbida en el tracto digestivo.

El ácido desoxicólico, produce una reducción de la saturación biliar de colesterol, disolviendo los cálculos.

Se absorbe en el tracto digestivo a nivel del íleon, se elimina por las heces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se deberá tener precaución si se ingiere bebidas alcohólicas u otros depresores del S.N.C., como también si aparece somnolencia con la medicación. Se deberá analizar la relación riesgo-beneficio durante el período de lactancia, ya que se excreta en la leche materna.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

1 comprimido antes del desayuno, almuerzo y cena.

RESTRICCIONES DE USO

No debe administrarse durante el primer trimestre del embarazo, ni en el último trimestre de la gestación. En mujeres en período de lactación, su empleo debe ser por prescripción médica.

SOBREDOSIS

Síntomas: pueden incluir somnolencia, desorientación y reacciones extrapiramidales.

Tratamiento: para controlar las reacciones extrapiramidales: pueden administrarse drogas anticolinérgicas, antihistamínicos con propiedades anticolinérgicas o fármacos antiparkinsonianos.

En caso de sobredosis o intoxicación, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo 20 comprimidos.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 08477-05-EF

Mantener a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. N° 4468

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administr.: Av. Brasilina N° 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay